

Eine neue Chamalycaeus-Art aus Vietnam (Gastropoda: Cyclophoridae, Alycaeninae)

VARGA András

Mátra Múzeum, Gyöngyös

ABSTRACT: (A new Chamalycaeus-species from Vietnam.) - The author describes a new species of Cyclophoridae, terrestrial operculate Prosobranchs, from the rain forests of Northern Vietnam, collected by T. PÓCS in 1963.

CHAMALYCAEUS (DICHARAX) FRACTUS n. sp.

Gehäuse unregelmässig, mit 4 1/2 Umgängen (Abb. 1-4). Der letzte Umgang stark aufgeblasen, Gewinde kegelförmig. Nabel tief, bis zur Spitze reichend. Apex abgestumpft, glatt, mit 2 1/10 Umgängen. Mündung schief, zusammenhängend, doppelt. Innere Lippe stark vorgezogen, am Nabel schwach vorspringend, an der Mündungswand losgelöst, am Aussenrand mit einem starken, breiten (0,45 mm), aussen gestreiften Wulst. Äussere Lippe schwach entwickelt, leistenförmig, an der Mündungswand nicht zusammenhängend, an der Naht abgeflacht, scharfkantig. Einschnürung breit, in der Mitte aufgetrieben, gegen die Nahtröhre hin glatt, am Mündungsrand fein gerippt. Nahtröhre 3 mm lang, 2,2 mm hinter der Mündung beginnend, eingesenkt, am Ende abgeflacht. Schale an der Nahtröhre regelmässig stark gerippt, auf den mittleren Umgängen feiner, zwischen den Rippen quergestreift (Abb. 5). Deckel unbekannt. Mündung beschädigt.

Masse des Holotypus: H. 3,1 mm, Durchm. 4:3,2 mm.


Locus typicus: Vietnam, Naturschutzpark Cuc Phuong beim Dorf Dong, im Regenwald am Fusse von Kalkfelsen. Leg. Okt. 1963 T. PÓCS.

Material: In der Molluskensammlung des Ungarischen Naturwissenschaftlichen Museums zu Budapest. Nur Holotypus bekannt.

Beziehungen: Von den vietnamesischen Arten kann die neue Art aufgrund der Schalengrösse und der Länge der Nahröhre leicht getrennt werden.

VARGA, A.: Egy új Chamalycaeus- (csiga-) faj Vietnámból

A szerző Chamalycaeus (Dicharax) fractus n. sp. néven egy a vietnámi őserdőkből származó új fajt ír le PÓCS Tamás gyűjtéséből. Az új faj legjellemzőbb vonása a hosszú varratcső (3 mm); ennek alapján valamennyi eddig ismert fajtól jól elkülöníthető.



Chamalycaeus (Dicharax) fractus n. sp.
Abb. 1-4: Gehäuse. Abb. 5: Querstreifung der Rippen.

LITERATUR - IRODALOM

- BAVAY, A. - DAUTZENBERG, Ph. (1900): Diagnoses de coquilles nouvelles de l'Indo-Chine. - J. Conchyl., Paris, 48: 108-122.
- KOBELT, W. (1902): Cyclophoridae. In: Das Tierreich. 16, Mollusca, 1-663.
- ZILCH, A. (1957): Die Typen und Typoide des Natur-Museums Senckenberg, 20: Mollusca, Cyclophoridae, Alycaeinae. - Arch. Moll., Frankfurt a. M., 85: 141-150.

Angekommen: 5. 9. 1973

VARGA, András
Mátra Múzeum
H-3200 Gyöngyös